



MODE D'EMPLOI DES PRÉPARATIONS

Vous devez suivre les directives suivantes pour assurer la bonne santé de votre bébé. Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon. Une hygiène, une préparation, une reconstitution et un entreposage adéquats sont importants lors de l'utilisation d'une préparation pour nourrissons. Utilisez selon les directives de votre professionnel de la santé.



MISE EN GARDE :

Ne jamais chauffer la préparation au four à micro-ondes, car il y a risque de brûlures graves. Vérifier la température avant de donner le biberon pour éviter de brûler la bouche du bébé.

Poudre	Liquide concentré	Prêt à servir																																													
Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et ne doivent être données aux bébés prématurés, de faible poids à la naissance ou dont le système immunitaire est affaibli que selon les directives et sous la supervision d'un professionnel de la santé.	Mélanger une quantité égale d'eau (bouillie puis refroidie jusqu'à la température ambiante) et de liquide concentré.	Ne pas ajouter d'eau.																																													
AJOUTER DE L'EAU	AJOUTER DE L'EAU	NE PAS AJOUTER D'EAU																																													
1. Laver les biberons, les tétines, les bagues, les bouchons et le reste du matériel, puis les mettre dans l'eau bouillante et laisser bouillir pendant 2 minutes. Dans une autre casserole, faire bouillir de l'eau pendant 2 minutes. Laisser refroidir jusqu'à la température ambiante. 2. Verser la quantité désirée d'eau bouillie refroidie dans le biberon. 3. À l'aide de la mesurette fournie, ajouter une mesurette rase et non tassée de poudre par 60 mL d'eau. Replacer la mesurette sèche dans le contenant. 4. Mettre le bouchon sur le biberon; agiter vigoureusement; fixer la tétine.	1. Laver les biberons, les tétines, les bagues, les bouchons et le reste du matériel, puis les mettre dans l'eau bouillante et laisser bouillir pendant 2 minutes. Dans une autre casserole, faire bouillir de l'eau pendant 2 minutes. Laisser refroidir jusqu'à la température ambiante. 2. Nettoyer le dessus de la boîte. Bien agiter avant d'ouvrir. Verser une quantité égale de liquide concentré et d'eau bouillie refroidie dans le biberon. 3. Mettre le bouchon sur le biberon; agiter vigoureusement; fixer la tétine.	Bouteilles de plastique de 59 mL et de 235 mL : 1. Laver les tétines, les bagues et les bouchons, puis les mettre dans l'eau bouillante et laisser bouillir pendant 2 minutes. 2. BIEN AGITER LA BOUTEILLE avant de l'ouvrir et dévisser le bouchon. 3. Visser la tétine.																																													
GUIDE DE RECONSTITUTION <table><tr><th>Eau</th><th>+</th><th>Mesurette(s)</th><th></th></tr><tr><td>60 mL</td><td></td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>120 mL</td><td></td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>180 mL</td><td></td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>240 mL</td><td></td><td>4</td><td></td></tr></table>	Eau	+	Mesurette(s)		60 mL		1		120 mL		2		180 mL		3		240 mL		4		GUIDE DE RECONSTITUTION <table><tr><th>Eau bouillie refroidie</th><th></th><th>Liquide concentré</th><th></th><th>Préparation reconstituée</th></tr><tr><td>30 mL</td><td>+</td><td>30 mL</td><td>=</td><td>60 mL</td></tr><tr><td>60 mL</td><td></td><td>60 mL</td><td></td><td>120 mL</td></tr><tr><td>90 mL</td><td></td><td>90 mL</td><td></td><td>180 mL</td></tr><tr><td>120 mL</td><td></td><td>120 mL</td><td></td><td>240 mL</td></tr></table>	Eau bouillie refroidie		Liquide concentré		Préparation reconstituée	30 mL	+	30 mL	=	60 mL	60 mL		60 mL		120 mL	90 mL		90 mL		180 mL	120 mL		120 mL		240 mL	Boîtes : 1. Laver les biberons, les tétines, les bagues, les bouchons et le reste du matériel, puis les mettre dans l'eau bouillante et laisser bouillir pendant 2 minutes. 2. Nettoyer le dessus de la boîte. Bien agiter avant d'ouvrir. Verser la préparation dans le biberon et fixer la tétine.
Eau	+	Mesurette(s)																																													
60 mL		1																																													
120 mL		2																																													
180 mL		3																																													
240 mL		4																																													
Eau bouillie refroidie		Liquide concentré		Préparation reconstituée																																											
30 mL	+	30 mL	=	60 mL																																											
60 mL		60 mL		120 mL																																											
90 mL		90 mL		180 mL																																											
120 mL		120 mL		240 mL																																											
Réfrigérer les biberons de préparation reconstituée immédiatement; utiliser dans les 24 heures. Jeter toute quantité de préparation laissée dans le biberon plus d'une heure après le début de la tétée.	Couvrir les biberons préparés et les boîtes ouvertes et les réfrigérer immédiatement; utiliser dans les 48 heures. Jeter toute quantité de préparation laissée dans le biberon plus d'une heure après le début de la tétée.	Couvrir les biberons préparés et les boîtes ouvertes et les réfrigérer immédiatement; utiliser dans les 48 heures. Jeter toute quantité de préparation laissée dans le biberon plus d'une heure après le début de la tétée.																																													

Pour obtenir le mode d'emploi complet, consultez l'étiquette du produit.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web similac.ca ou appeler notre ligne ExpertsEnNutrition Similac® au 1-855-370-7878. Les directives de préparation sont offertes en 14 langues différentes.