

## Information Produit: Bâtons glacés Pedialyte®

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le  
[www.abbottnutrition.ca](http://www.abbottnutrition.ca)

# Bâtons glacés Pedialyte®

Solution de réhydratation orale pour tous

## Usage

- 1 Pedialyte® est spécialement conçu pour aider à prévenir la déshydratation chez les enfants et les adultes, en comblant les pertes de liquides et d'électrolytes causées par la diarrhée et les vomissements. Il peut être utilisé pour maintenir l'équilibre hydrique et électrolytique à la suite d'un traitement parentéral de la diarrhée.

## Caractéristiques

- 1 La marque la plus recommandée par les médecins et les pharmaciens.
- 1 Renferme les teneurs en sucre et en sodium optimales recommandées par les experts<sup>1,2</sup> pour aider à prévenir la déshydratation causée par la diarrhée et les vomissements.
- 1 Favorise plus efficacement l'absorption des liquides que les boissons ordinaires.
- 1 Faible osmolalité.
- 1 Quatre délicieuses saveurs afin de favoriser l'observance du traitement nutritionnel.
- 1 Sans gluten.
- 1 Cascher.



## Précautions De Sécurité

- 1 Non indiqué pour l'administration par voie parentérale.
- 1 Pour les enfants de moins d'un an, consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé qualifié avant d'utiliser Pedialyte®, car les nourrissons et les jeunes enfants sont plus à risque de déshydratation.

<sup>1</sup> Organisation mondiale de la santé. Oral Rehydration Salts: Production of the new ORS. 2006.

<sup>2</sup> Leung A, Prince T. Paediatr Child Health. 2006;11(8):535-9

## Ingrédients

### Liquide Saveurs Variées:

Ingrédients Médicinaux: Chlorure de Sodium, Citrate de Potassium. Ingrédients Non Médicinaux: Eau, Dextrose (25 g/L), Acide Citrique, Carboxyméthylcellulose Sodique, Sorbate de Potassium, Benzoate de Sodium, Sucralose, Acésulfame-Potassium, La saveur de raisin contient également: Arômes de raisin naturel et artificiel, AD&C rouge No. 40 et AD&C bleu No. 1, La saveur de cerise contient également: Arômes de cerise naturel et artificiel et AD&C rouge No. 40, La saveur d'orange contient également: Arômes d'orange naturel et artificiel, AD&C jaune No. 6 et AD&C rouge No. 40, et La saveur de framboise bleue contient également: Arômes de framboise bleue naturel et artificiel et AD&C bleu No. 1..

## Présentation

Numéro De Référence	Item
0024513	Bâtons glacés Pedialyte® (saveurs variées); 16 enveloppes de 62,5 mL; 8 x 16/caisse

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le [www.abbottnutrition.ca](http://www.abbottnutrition.ca)

# Bâtons glacés Pedialyte®

Solution de réhydratation orale pour tous

## Information Nutritionnelle - Liquide Saveurs Variées

	1000 mL	62,5 mL
	Valeur	Valeur
Énergie, Cal (kJ)	100 (418)	6,3 (26,1)
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX:		
Sodium, g (mmol)	1,037 (45)	0,065 (2,8)
Potassium, g (mmol)	0,780 (20)	0,0488 (1,3)
Chlorure, g (mmol)	1,244 (35)	0,00778 (2,2)
Dextrose, g	25	1,6

## Caractéristiques Du Produit

	Valeur
Densité calorique (Cal/mL)	0,10
Protéines (% de l'énergie totale)	0
Source de protéines	S.O.
Lipides (% de l'énergie totale)	0
Huile de TCM (% des lipides totaux)	S.O.
Rapport oméga-6:oméga-3	S.O.
Source de lipides	S.O.
Glucides (% de l'énergie totale)	100
Source de glucides	S.O.
Rapport Cal totales:g d'azote	S.O.
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	S.O.
Eau (g/L)	973
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	270
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	100
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/ pompe (Fr)	S.O.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le [www.abbottnutrition.ca](http://www.abbottnutrition.ca)

## Préparation

### Mode d'emploi:

Retirer les Bâtons Glacés du carton et les congeler avant de les séparer. Utilisation sous forme liquide: Séparer délicatement les Bâtons Glacés afin d'éviter les fuites.

**USAGE RECOMMANDÉ:** Utiliser Pedialyte® plutôt que des jus, des boissons gazeuses, des boissons énergétiques ou de l'eau pour prévenir la déshydratation causée par la diarrhée ou des vomissements.

### ADMINISTRATION RECOMMANDÉE:

**Pour manger congelé:** Couper le bout du Bâton Glacé avec des ciseaux propres. Faire sortir le Bâton Glacé en poussant sur l'extrémité inférieure de l'enveloppe de plastique.

**Pour boire:** Couper le bout de l'enveloppe de plastique avec des ciseaux propres. Verser le liquide dans un **verre**.

**Barbotine:** Passer au mélangeur des quantités égales de Bâtons Glacés sous forme liquide et de Bâtons Glacés congelés.

### POSOLOGIE RECOMMANDÉE:

#### Enfants moins de 2 ans

- 1 Consulter un médecin avant de donner Pedialyte®.

#### Enfants de 2 à 11 ans

- 1 Donner de 50 à 100 mL (de 1 à 2 Bâtons Glacés) par kg de poids corporel/jour.
- 1 Offrir aussi souvent que désiré.
- 1 De 16 à 32 Bâtons Glacés par jour peuvent être nécessaires.
- 1 Poursuivre jusqu'à ce que la diarrhée ou les vomissements aient disparu.

#### Adolescents plus de 12 ans et adultes

- 1 Offrir aussi souvent que désiré.
- 1 De 16 à 32 Bâtons Glacés par jour peuvent être nécessaires.
- 1 Poursuivre jusqu'à ce que la diarrhée ou les vomissements aient disparu.