

Information Produit: Pedialyte® AdvancedCare®

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le
www.abbottnutrition.ca

Usage

- 1 Pedialyte® AdvancedCare® contient des prébiotiques PreActiv® et est spécialement conçu pour aider à prévenir la déshydratation chez les enfants et les adultes, en comblant les pertes de liquides et d'électrolytes causées par la diarrhée et les vomissements. Il peut être utilisé pour maintenir l'équilibre hydrique et électrolytique à la suite d'un traitement parentéral de la diarrhée.

Caractéristiques

- 1 La marque la plus recommandée par les médecins et les pharmaciens.
- 1 Contient des prébiotiques PreActiv®, sous la forme de galactooligosaccharides (GOS) qui aident à stimuler la prolifération des bonnes bactéries dans le gros intestin.
- 1 Renferme les teneurs en sucre et en sodium optimales recommandées par les experts^{1,2} pour aider à prévenir la déshydratation causée par la diarrhée et les vomissements.
- 1 Aide à combler les pertes de zinc dues à la diarrhée^{3,4}.
- 1 Favorise plus efficacement l'absorption des liquides que les boissons ordinaires.
- 1 Bouteilles refermables de 1 L, pour mesurer et verser plus facilement.
- 1 Deux délicieuses saveurs afin de favoriser l'observance du traitement nutritionnel.
- 1 Faible osmolalité.
- 1 Sans gluten.
- 1 Cascher.
- 1 Halal
 - Non (punch à la cerise)
 - Oui (Framboise bleue)



Précautions De Sécurité

- 1 Non indiqué pour l'administration par voie parentérale.
- 1 Ne pas utiliser chez les enfants qui présentent une allergie au lait, une allergie aux galactooligosaccharides ou une galactosémie.
- 1 Pour les enfants de moins d'un an, consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé qualifié avant d'utiliser Pedialyte®, car les nourrissons et les jeunes enfants sont plus à risque de déshydratation.

¹ Organisation mondiale de la santé. Oral Rehydration Salts: Production of the new ORS. 2006.

² Leung A, Prince T. Paediatr Child Health. 2006;11(8):535-9

³ Bhatnagar S, et al. JPGN. 2004;38(1):34-40

⁴ Lukacik M, Thomas RL, Aranda JV. Pediatrics. 2008;121(2):326-36.

Ingrédients

Liquide Punch à la Cerise:

Ingrédients Médicinaux: Dextrose, Galactooligosaccharides, Acide Citrique, Citrate de Potassium, Chlorure de Sodium, Citrate de Sodium, Gluconate de Zinc. Ingrédients Non Médicinaux: Eau, Arômes Naturel et Artificiel, Sucralose, Acésulfame-Potassium, et AD&C Rouge No. 40.

Pedialyte® AdvancedCare®

Solution de réhydratation orale pour tous

Présentation

Numéro De Référence	Item
6647013	Pedialyte® AdvancedCare®, punch à la cerise; bouteilles de plastique refermables de 1 L; 8/caisse
6647113	Pedialyte® AdvancedCare®, framboise bleue; bouteilles de plastique refermables de 1 L; 8/caisse

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le www.abbottnutrition.ca

Information Nutritionnelle - Liquide Punch à la Cerise

	1000 mL
	Valeur
Énergie, Cal (kJ)	100 (418)
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX:	
Sodium, mg (mmol)	1030 (45)
Potassium, mg (mmol)	782 (20)
Chlorure, mg (mmol)	1244 (35)
Citrate, g (mmol)	4,8 (25,5)
Zinc, mg	7,8
Galactooligosaccharides (GOS), g	3,2
Dextrose, g	16,0

Caractéristiques Du Produit

	Valeur
Densité calorique (Cal/mL)	0,10
Protéines (% de l'énergie totale)	0
Source de protéines	S.O.
Lipides (% de l'énergie totale)	0
Huile de TCM (% des lipides totaux)	S.O.
Rapport oméga-6:oméga-3	S.O.
Source de lipides	S.O.
Glucides (% de l'énergie totale)	100
Source de glucides	S.O.
Rapport Cal totales:g d'azote	S.O.
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	S.O.
Eau (g/L)	970
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	226
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	100
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/ pompe (Fr)	S.O.

Preparation

Mode d'emploi:

- 1 A meilleur goût lorsque servi froid.
- 1 Ne pas utiliser si la pellicule de protection autour du bouchon ou l'opercule en aluminium sont brisés ou ont été retirés.
- 1 Ouverture de la bouteille: Enlever la pellicule de protection. Dévisser le bouchon. Enlever l'opercule en aluminium.
- 1 Ne pas ajouter d'eau ni diluer.

Posologie recommandée:

- 1 Nourrissons moins de 1 an
 - 1 **Consulter un médecin avant d'utiliser Pedialyte Advanced Care.**
- 1 Enfants de 1 an*
 - 1 Donner de 50 à 100 mL par épisode de diarrhée ou de vomissements, sans dépasser 1 L par période de 24 heures.
- 1 Enfants de 2 à 9 ans*
 - 1 Donner de 100 à 200 mL par épisode de diarrhée ou de vomissements, sans dépasser 1 L par période de 8 à 24 heures.
- 1 Adultes, adolescents et enfants plus de 10 ans*
 - 1 Prendre de 200 à 400 mL par épisode de diarrhée ou de vomissements, ou autant que désiré.

* Essayer de donner/prendre la solution dès que la diarrhée commence. Donner/prendre la solution fréquemment et en petites quantités (p. ex., 5 mL), en augmentant graduellement la portion, selon la quantité tolérée. Si une plus grande quantité est nécessaire/désirée, augmenter la consommation, selon la quantité tolérée. Si la déshydratation est causée par autre chose, consulter un professionnel de la santé.

Storage & Handling

Conserver les bouteilles non ouvertes dans un endroit frais. Éviter la chaleur excessive. Ne pas réutiliser la bouteille. Après ouverture, remettre le bouchon, réfrigérer et utiliser dans les 96 heures. Jeter par la suite.