

Information Produit: Pedialyte®

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le
www.abbottnutrition.ca

Usage

- 1 Pedialyte® est spécialement conçu pour aider à prévenir la déshydratation chez les enfants et les adultes, en comblant les pertes de liquides et d'électrolytes causées par la diarrhée et les vomissements. Il peut être utilisé pour maintenir l'équilibre hydrique et électrolytique à la suite d'un traitement parentéral de la diarrhée.

Caractéristiques

- 1 La marque la plus recommandée par les médecins et les pharmaciens.
- 1 Renferme les teneurs en sucre et en sodium optimales recommandées par les experts^{1,2} pour aider à prévenir la déshydratation causée par la diarrhée et les vomissements.
- 1 Aide à combler les pertes de zinc dues à la diarrhée^{3,4}.
- 1 Favorise plus efficacement l'absorption des liquides que les boissons ordinaires.
- 1 Faible osmolalité.
- 1 Bouteilles refermables de 1 L, pour mesurer et verser plus facilement.
- 1 Solution non aromatisée offerte pour les nourrissons – sans édulcorants artificiels, colorants ni arômes.
- 1 Trois délicieuses saveurs afin de favoriser l'observance du traitement nutritionnel.
- 1 Sans gluten.
- 1 Cascher.
- 1 Halal (sauf pour la saveur de fruits).



Précautions De Sécurité

- 1 Non indiqué pour l'administration par voie parentérale.
- 1 Pour les enfants de moins d'un an, consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé qualifié avant d'utiliser Pedialyte®, car les nourrissons et les jeunes enfants sont plus à risque de déshydratation.

¹ Organisation mondiale de la santé. *Oral Rehydration Salts: Production of the new ORS*. 2006.

² Leung A, Prince T. *Paediatr Child Health*. 2006;11(8):535-9

³ Bhatnagar S, et al. *JPGN*. 2004;38(1):34-40

⁴ Lukacik M, Thomas RL, Aranda JV. *Pediatrics*. 2008;121(2):326-36.

Ingrédients

Liquide Non Aromatisé:

Ingrédients Médicinaux: Dextrose, Citrate de Potassium, Chlorure de Sodium, Citrate de Sodium, Acide Citrique, Gluconate de Zinc. Ingrédients Non Médicinaux:, et Eau.

Présentation

Numéro De Référence	Item
5989213	Pedialyte®, non aromatisé; bouteilles de plastique de 59 mL; 48/caisse
6646713	Pedialyte®, non aromatisé; bouteilles de plastique refermables de 1 L; 8/caisse
6646813	Pedialyte®, fruits; bouteilles de plastique refermables de 1 L; 8/caisse
6646913	Pedialyte®, raisin; bouteilles de plastique refermables de 1 L; 8/caisse
6902213	Pedialyte®, fraise; bouteilles de plastique refermables de 1 L; 8/caisse

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le www.abbottnutrition.ca

Information Nutritionnelle - Liquide Non Aromatisé

	100 mL	59 mL	1000 mL
	Valeur	Valeur	Valeur
Énergie, Cal (kJ)	11 (46)	6,5 (27)	110 (460)
INGRÉDIENTS MÉDICINAUX:			
Sodium, mg (mmol)	104 (4,5)	61 (2,7)	1035 (45)
Potassium, mg (mmol)	78,2 (2,0)	46,1 (1,2)	782 (20)
Chlorure, mg (mmol)	124 (3,5)	73 (2,1)	1240 (35)
Citrate, g (mmol)	0,26 (1,4)	0,15 (0,8)	2,64 (14,0)
Zinc, mg	0,78	0,5	7,8
Dextrose, g	2,5	1,5	25

Caractéristiques Du Produit

	Valeur
Densité calorique (Cal/mL)	0,11
Protéines (% de l'énergie totale)	0
Source de protéines	S.O.
Lipides (% de l'énergie totale)	0
Huile de TCM (% des lipides totaux)	S.O.
Rapport oméga-6:oméga-3	S.O.
Source de lipides	S.O.
Glucides (% de l'énergie totale)	100
Source de glucides	S.O.
Rapport Cal totales:g d'azote	S.O.
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	S.O.
Eau (g/L)	978
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	250
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	100
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/ pompe (Fr)	S.O.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le www.abbottnutrition.ca

Preparation

Mode d'emploi:

- 1 A MEILLEUR GOÛT LORSQUE SERVI FROID.
- 1 NE PAS UTILISER SI LA PELLICULE DE PROTECTION AUTOUR DU BOUCHON OU L'OPERCULE EN ALUMINIUM SONT BRISÉS OU ONT ÉTÉ RETIRÉS.
- 1 Conserver les bouteilles non ouvertes dans un endroit frais. Éviter la chaleur excessive.
- 1 Ouverture de la bouteille:
 - 1 Enlever la pellicule de protection.
 - 1 Dévisser le bouchon.
 - 1 Enlever l'opercule en aluminium.
- 1 Ne pas ajouter d'eau ni diluer.
- 1 Ne pas réutiliser la bouteille.
- 1 Après ouverture, remettre le bouchon, réfrigérer et utiliser dans les 96 heures.

Posologie recommandée:

- 1 Nourrissons de moins de 1 an
 - 1 Consulter un médecin avant d'utiliser Pedialyte.
- 1 Enfants de 1 an*
 - 1 Donner de 50 à 100 mL par épisode de diarrhée ou de vomissements, sans dépasser 1 L par période de 24 heures.
- 1 Enfants de 2 à 9 ans*
 - 1 Donner de 100 à 200 mL par épisode de diarrhée ou de vomissements, sans dépasser 1 L par période de 8 à 24 heures.
- 1 Adultes, adolescents et enfants 10 ans ou plus vieux
 - 1 Prendre de 200 à 400 mL par épisode de diarrhée ou de vomissements, ou autant que désiré.

* Essayer de donner/prendre la solution dès que la diarrhée commence. Donner/prendre la solution fréquemment et en petites quantités (p. ex., 5 mL), en augmentant graduellement la portion, selon la quantité tolérée. Si une plus grande quantité est nécessaire/désirée, augmenter la consommation, selon la quantité tolérée. Si la déshydratation est causée par autre chose, consulter un professionnel de la santé.