

**Information Produit:
Supplément au lait humain Similac®**

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le
www.abbottnutrition.ca

Supplément au lait humain Similac®

Pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance

Usage

- 1 Pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance qui reçoivent du lait humain et ont besoin d'un supplément pour combler leurs besoins élevés en nutriments.
- 1 Supplément nutritionnel à ajouter au lait maternel.
- 1 Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.
- 1 À utiliser sous supervision médicale.

Caractéristiques

- 1 Des études revues par des pairs ont montré :
 - Des augmentations normales du poids, de la taille et du périmètre crânien chez les nourrissons prématurés¹.
 - Une préservation des effets antibactériens du lait maternel contre *Escherichia coli*, les *staphylocoques*, les *streptocoques du groupe B* et *Enterobacter sakazakii* (maintenant appelé *Cronobacter sakazakii*)².
- 1 Faible teneur en fer offrant la possibilité d'ajouter la quantité de fer requise selon les besoins.
- 1 Se mélange bien au lait maternel.
- 1 Emballage petit et pratique.
- 1 Hyporésiduel.
- 1 Sans gluten.
- 1 Cascher.
- 1 Halal.

Précautions De Sécurité

- 1 Ne jamais chauffer le lait humain enrichi au micro-ondes, car il y a risque de brûlures graves. Vérifier la température avant de donner le biberon pour éviter de brûler la bouche du bébé.
- 1 Chez les nourrissons prématurés, de faible poids à la naissance ou dont le système immunitaire est affaibli, il est recommandé d'utiliser de préférence des préparations liquides stériles³. Ce produit n'est pas stérile et doit être utilisé seulement selon les directives d'un professionnel de la santé.
- 1 Il faut confirmer que le bébé tolère bien l'alimentation entérale en lui donnant de petites quantités de lait maternel non enrichi. Lorsque la tolérance à l'alimentation entérale est établie, ajouter le Supplément au lait humain Similac® au lait maternel.
- 1 Non destiné à l'alimentation des nourrissons de faible poids à la naissance qui ont atteint un poids de 3 600 g (environ 8 lb), à moins d'indication contraire de la part d'un professionnel de la santé.
- 1 Ajouter au lait maternel seulement – ne pas ajouter d'eau.
- 1 Un supplément de fer peut être nécessaire.
- 1 Non indiqué pour l'administration par voie parentérale.

¹ Barrett-Reis B, et al. *Pediatrics*. 2000;106:581-588.

² Chan GM. *J Perinatol*. 2003;23:620-623.

³ Gouvernement du Canada. *Reconstitution et manipulation d'une préparation en poudre pour nourrissons*. Dernière modification : 2021-04-16. [Consultation : 2021-05-30].



Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le www.abbottnutrition.ca

Supplément au lait humain Similac®

Pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance

Ingrédients

Poudre Non Aromatisé:

Lait Écrémé, Concentré de Protéines de Lactosérum, Extrait Sec de Sirop de Maïs, Huiles de Copra et [ou] de Palmiste Modifiées (Triglycérides à Chaîne Moyenne), Phosphate Calcique, Citrate de Potassium, Acide Ascorbique, Chlorure de Magnésium, Lécithine de Soya, Chlorure de Sodium, Sulfate de Zinc, M-Inositol, Niacinamide, Citrate de Sodium, Acétate de D-Alpha Tocophéryle, Pantothénate de Calcium, Sulfate Ferreux, Palmitate de Vitamine A, Sulfate de Cuivre, Riboflavine, Chlorhydrate de Chlorure de Thiamine, Chlorhydrate de Pyridoxine, Vitamine D3, Biotine, Acide Folique, Sulfate de Manganèse, Phylloquinone, Cyanocobalamine, Séléniate de Sodium, et Au Besoin: Phosphate de Potassium, Hydroxyde de Potassium, Carbonate de Calcium.

Allergens: Contient : Lait, Soya.

Présentation

Numéro De Référence	Item
5459813	Supplément au lait humain Similac®; 50 sachets de 0,90 g sachets/boîte; boîtes de 3/caisse

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le www.abbottnutrition.ca

Supplément au lait humain Similac®

Pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance

Information Nutritionnelle - Poudre Non Aromatisé

	1 packet (0.9 g)	4 packets
	Valeur	Valeur
Énergie, Cal (kJ)	3,5 (15)	14 (59)
Protéines, g	0,25	1,0
Lipides, g	0,09	0,36
Glucides, g	0,45	1,8
Vitamine A, UI	155	620
Vitamine D, UI	30	120
Vitamine E, UI	0,8	3,2
Vitamine K, mg	0,0021	0,0083
Vitamine C, mg	6,3	25
Thiamine, mg	0,058	0,233
Riboflavine, mg	0,104	0,417
Niacine, mg	0,893	3,57
Vitamine B6, mg	0,053	0,211
Acide folique, mg	0,00575	0,023
Vitamine B12, mg	0,00016	0,00064
Acide pantothénique, mg	0,375	1,5
Biotine, mg	0,0065	0,026
Choline, mg	0,5	1,8
Inositol, mg	1	3,85
Sodium, mg	4	15
Potassium, mg	16	63
Chlorure, mg	9	38
Calcium, mg	29	117
Phosphore, mg	16	67
Magnésium, mg	1,7	7,0
Fer, mg	0,08	0,35
Zinc, mg	0,25	1,0
Iode, mg	0,0008	0,0016
Cuivre, mg	0,043	0,170
Manganèse, mg	0,0018	0,0072
Sélénium, mg	0,0001	0,0005

Caractéristiques Du Produit

	Valeur
DILUTION NORMALE	
Densité calorique (Cal/mL)	0,77†
Protéines (% de l'énergie totale)	28,2
Source de protéines	Lait écrémé, concentré de protéines de lactosérum

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le www.abbottnutrition.ca

Supplément au lait humain Similac®

Pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance

Caractéristiques Du Produit

	Valeur
Lipides (% de l'énergie totale)	21,1
Huile de TCM (% des lipides totaux)	S.O.
Rapport oméga-6:oméga-3	7,5:1
Source de lipides	Huile de triglycérides à chaîne moyenne (TCM)
Glucides (% de l'énergie totale)	50,7
Source de glucides	Extrait sec de sirop de maïs, lactose
Rapport Cal totales:g d'azote	90:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	65:1
Eau (g/L)	0
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	385 [†]
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	231 [†]

[†] Valeur lorsque 1 sachet de Supplément au lait humain Similac® est mélangé à 25 mL de lait de mère de prématuré.

Preparation

Mode d'emploi:

UTILISER SELON LES DIRECTIVES DE VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ.

AJOUTER AU LAIT HUMAIN SEULEMENT. NE PAS AJOUTER D'EAU.

Ce supplément au lait humain est conçu pour les nourrissons prématurés ou de faible poids à la naissance et doit être ajouté au lait humain pour en accroître la valeur nutritive. Une hygiène, une manipulation et un entreposage adéquats sont importants lorsque l'on ajoute un supplément au lait humain. Ne pas respecter ces directives pourrait entraîner des complications graves.

- 1 Agiter doucement le contenant de lait humain. Verser la quantité désirée de lait humain dans un contenant d'alimentation stérile.
- 1 Pour ouvrir le sachet, déchirer la partie supérieure en suivant la ligne fléchée. NOTA: La couleur de la poudre peut varier légèrement d'un sachet à l'autre.
- 1 Ajouter le supplément au lait humain et agiter doucement.
 - 1 Alimentation au biberon: jeter une heure après le début de l'alimentation.
 - 1 Alimentation par sonde: suspendre pendant 4 heures au maximum¹.

Tableau de mélange

	Calories supplémentaires désirées	Lait de mère de prématuré	Supplément au lait humain Similac Concentration
Concentration initiale	2 Cal/30 mL	50 mL	1 sachet (0.9 g)
Pleine concentration	4 Cal/30 mL	25 mL	1 sachet (0.9 g)

1 Steele C and Collins E (Editors). Infant and Pediatric Feedings: Guidelines for Preparation of Human Milk and Formula in Health Care Facilities, 3rd Ed. Academy of Nutrition and Dietetics. 2019.