Information Produit:
Similac® Sensitive® Sensibilité au lactose

© 2024 Laboratoires Abbott Cie.

Abbott Nutrition Laboratoires Abbott Cie
Saint-Laurent, Québec, Canada H4S 1Z6
1-866-767-7411

Similac® Sensitive® Sensibilité au lactose

Préparation à teneur réduite en lactose*†

Usage

- Pour les nourrissons qui présentent des symptômes d'intolérance au lactose, notamment de l'irritabilité, des gaz ou une diarrhée[1].
- À utiliser comme substitut du lait maternel chez les nourrissons qui ne sont pas exclusivement allaités.
- Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Caractéristiques

- Teneur réduite en lactose*,†.
- Sans OGM‡.
- Facile à digérer§.
- Sans gluten.
- Cascher.
- Halal.

Précautions De Sécurité

- Les préparations en poudre pour nourrissons ne sont pas stériles et ne doivent être données aux nourrissons prématurés, de faible poids à la naissance ou dont le système immunitaire est affaibli que selon les directives et sous la supervision d'un professionnel de la santé.
- Ne jamais chauffer la préparation au four à micro-ondes, car il y a risque de brûlures graves. Vérifier la température avant de donner le biberon pour éviter de brûler la bouche du bébé.
- Non indiqué pour l'administration par voie parentérale.
- Non indiqué chez les nourrissons atteints de galactosémie, de dé?cit en lactase congénital ou d'allergie con?rmée aux protéines du lait de vache[2].

* *Comparativement à Similac Pro-Advance®.*

† *Ne convient pas aux nourrissons atteints de galactosémie.*

‡ *Sans ingrédients génétiquement modifiés.*

§ *Semblable à d'autres préparations pour nourrissons.*

[1] *Lasekan JB, et al. Clin Pediatr. 2011;50(4):330-337.*

[2] *Santé Canada, Société canadienne de pédiatrie, Les diététistes du Canada et Comité canadien pour l'allaitement (2015). La nutrition du nourrisson né à terme et en santé : Recommandations de la naissance à six mois. Dernière modification : 2015-08-18 [Consulté en ligne : 2024-04-30].*

Ingrédients

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le **www.abbottnutrition.ca**

© 2024 Laboratoires Abbott Cie.

Abbott Nutrition Laboratoires Abbott Cie
Saint-Laurent, Québec, Canada H4S 1Z6
1-866-767-7411

Similac® Sensitive® Sensibilité au lactose

Préparation à teneur réduite en lactose*†

Poudre Non Aromatisé:

Sirop de Maïs, Saccharose, Concentré de Protéines du Lait, Huile Végétale à Teneur Élevée en Acide Oléique (Carthame ou Tournesol), Huile de Copra, Huile de Soya, Citrate de Potassium, Citrate de Sodium, Chlorure de Potassium, Phosphate Calcique, Hydrolysat de Protéines de Lactosérum, Acide Ascorbique, Phosphate de Magnésium, Chlorure de Choline, Chlorure de Magnésium, Bitartrate de Choline, Sulfate Ferreux, Taurine, M-Inositol, Cytidine-5'-Monophosphate, Palmitate d'Ascorbyle, Guanosine-5'-Monophosphate Disodique, Acétate de D-Alpha Tocophéryle, Uridine-5'-Monophosphate Disodique, L-Carnitine, Sulfate de Zinc, Adénosine-5'-Monophosphate, Mélange de Tocophérols, Niacinamide, Hydroxyde de Potassium, D-Pantothénate de Calcium, Sulfate de Cuivre, Palmitate de Vitamine A, Chlorhydrate de Thiamine, Riboflavine, Chlorhydrate de Pyridoxine, Iodure de Potassium, Acide Folique, Sulfate de Manganèse, Phylloquinone, Biotine, Sélénite de Sodium, Vitamine D3, Cyanocobalamine, et Au Besoin: Carbonate de Calcium.

Allergens: Contient : Lait, Soya.

Présentation

Numéro De Référence	Item
6499813	Similac® Sensitive Sensibilité au lactose; contenants de 638 g; 6/caisse

© 2024 Laboratoires Abbott Cie.

Abbott Nutrition Laboratoires Abbott Cie
Saint-Laurent, Québec, Canada H4S 1Z6
1-866-767-7411

Similac® Sensitive® Sensibilité au lactose

Préparation à teneur réduite en lactose*†

Information Nutritionnelle - Poudre Non Aromatisé

	100 g (Poudre)	100 mL (dilution normale)	100 Cal
	Valeur	Valeur	Valeur
Énergie, Cal (kJ)	514 (2151)	68 (283)	100 (418)
Protéines, g	11,2	1,47	2,18
Lipides, g	28	3,68	5,45
Acide linoléique, g	3,97	0,52	0,77
Acide linolénique, g	0,38	0,05	0,07
Glucides, g	55	7,24	10,7
Vitamine A, UI	1433	189	279
Vitamine D, UI	305	40	59
Vitamine E, UI	20,3	2,7	3,9
Vitamine K, mg	0,068	0,0089	0,0132
Vitamine C, mg	76	10,0	15,0
Thiamine, mg	0,6	0,08	0,12
Riboflavine, mg	0,34	0,05	0,07
Niacine, mg	5,4	0,70	1,05
Acide pantothénique, mg	2,3	0,30	0,45
Vitamine B6, mg	0,31	0,04	0,06
Acide folique, mg	0,076	0,010	0,015
Vitamine B12, mg	0,00114	0,00015	0,00022
Biotine, mg	0,019	0,0025	0,0037
Choline, mg	62	8,2	12,1
Inositol, mg	30	3,9	5,8
Calcium, mg	441	58	86
Phosphore, mg	276	36	54
Magnésium, mg	31,5	4,2	6,1
Sodium, mg	154	20	30
Potassium, mg	620	82	121
Chlorure, mg	338	45	66
Fer, mg	9,1	1,20	1,8
Zinc, mg	3,8	0,50	0,74
Cuivre, mg	0,408	0,054	0,0793
Manganèse, mg	0,0363	0,005	0,0071
Iode, mg	0,09	0,012	0,018
Sélénium, mg	0,010	0,0013	0,0019
Carnitine, mg	8,4	1,1	1,6
Taurine, mg	34,6	4,6	6,7
Nucléotides, mg	54,7	7,2	10,6

Caractéristiques Du Produit

	Valeur

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le **www.abbottnutrition.ca**

© 2024 Laboratoires Abbott Cie.

Abbott Nutrition Laboratoires Abbott Cie
Saint-Laurent, Québec, Canada H4S 1Z6
1-866-767-7411

Similac® Sensitive® Sensibilité au lactose

Préparation à teneur réduite en lactose*†

DILUTION NORMALE	
Densité calorique (Cal/mL)	0,68
Protéines (% de l'énergie totale)	8,7
Source de protéines	Concentré de protéines du lait, hydrolysat de protéines de lactosérum
Lipides (% de l'énergie totale)	48,8
Huile de TCM (% des lipides totaux)	0,0
Rapport oméga-6:oméga-3	9,5:1
Source de lipides	Huile végétale riche en acide oléique (carthame ou tournesol), huile de copra, huile de soya
Glucides (% de l'énergie totale)	42,5
Source de glucides	Sirop de maïs, saccharose
Rapport Cal totales:g d'azote	293:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	268:1
Eau (g/L)	901
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	200
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	136
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/ pompe (Fr)	S.O.

Preparation

Mode d'emploi:

Vous devez suivre les directives suivantes pour assurer la bonne santé de votre bébé. Une hygiène, une préparation, une reconstitution et un entreposage adéquats sont importants lors de l'utilisation d'une préparation pour nourrissons. Ne pas respecter ces directives pourrait entraîner des complications graves. Utiliser selon les directives de votre professionnel de la santé.

- Se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon.
- Stériliser [le matériel]: Laver les biberons, les tétines, les bagues, les bouchons et le reste du matériel, puis les mettre dans l'eau bouillante et laisser bouillir pendant 2 minutes. Stériliser [l'eau]: Dans une autre casserole, faire bouillir de l'eau pendant 2 minutes. Laisser refroidir jusqu'à la température ambiante.
- Mélanger la préparation à l'aide de la mesurette fournie. Voir le GUIDE DE RECONSTITUTION. Replacer la mesurette sèche dans le contenant.
- Mettre le bouchon sur le biberon; agiter vigoureusement; fixer la tétine.

- Jeter toute quantité de préparation laissée dans le biberon plus d'une heure après le début de la tétée.
- Réfrigérer les biberons de préparation reconstituée immédiatement; utiliser dans les 24 heures.
- Conserver le contenant à la température ambiante.
- Une fois le contenant ouvert, utiliser le contenu dans le mois qui suit.
- Ne pas réutiliser le contenant.

GUIDE DE RECONSTITUTION

Eau stérilisée refroidie	Mesurette(s) rase et non tassée.
60 mL	1
120 mL	2
180 mL	3
240 mL	4

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le **www.abbottnutrition.ca**

© 2024 Laboratoires Abbott Cie.

Abbott Nutrition Laboratoires Abbott Cie
Saint-Laurent, Québec, Canada H4S 1Z6
1-866-767-7411