

Similac Pro-Advance® Étape 1 prêt à servir

Préparation enrichie de 2'-FL (un oligosaccharide), d'ADH et d'ARA

Information Produit: Similac Pro-Advance® Étape 1 prêt à servir

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le
www.abbottnutrition.ca

Similac Pro-Advance® Étape 1 prêt à servir

Préparation enrichie de 2'-FL (un oligosaccharide), d'ADH et d'ARA

Usage

- 1 À utiliser comme substitut du lait maternel chez les nourrissons qui ne sont pas exclusivement allaités.
- 1 Pour l'alimentation par voie orale ou par sonde.

Caractéristiques

- 1 Notre préparation la plus avancée enrichie de 2'-FL*.
- 1 Le 2'-FL a une structure identique à celle du 2'-FL présent dans le lait maternel¹. Le 2'-FL est l'oligosaccharide de lait humain (OLH) le plus abondant dans le lait de la plupart des mères².
- 1 L'ajout de 2'-FL* à une préparation pour nourrissons peut favoriser le développement et la régulation de la réponse immunitaire chez les nourrissons recevant cette préparation - de façon plus semblable à ce que l'on observe chez les bébés allaités^{3,†}.
- 1 ADH, un acide gras oméga-3 qui contribue au développement physique normal du cerveau et des yeux⁴.
- 1 Lutéine, un antioxydant présent dans le lait maternel, et qui se concentre dans le cerveau et les yeux des bébés^{5,6,7}. Des études récentes montrent que la lutéine pourrait jouer un rôle dans le développement visuel et cognitif⁸.
- 1 Vitamine E, un antioxydant alimentaire qui prévient l'oxydation des graisses contenues dans les tissus⁴. Similac Pro-Advance® contient de la vitamine E naturelle[‡], le type le plus abondant de vitamine E dans le lait maternel et le cerveau des nourrissons^{9,10}.
- 1 Sans OGM[§].
- 1 Facile à digérer[¶].
- 1 Sans gluten.
- 1 Cascher.
- 1 Halal.

Précautions De Sécurité

- 1 Non indiqué pour l'administration par voie parentérale.

* Ne provient pas de lait humaine.

† Le lait maternel est l'aliment idéal pour les bébés, car il contient de nombreux facteurs immunitaires qu'on ne trouve pas dans les préparations pour nourrissons, et on recommande d'y avoir recours aussi longtemps que possible.

‡ RRR-alpha-tocophérol, la forme la plus bioactive de vitamine E.

§ Sans ingrédients génétiquement modifiés.

¶ Semblable à d'autres préparations pour nourrissons.

¹ Weichert S et al. Nutr Res 2013;33(10):831-8.

² Castanys-Muñoz E et al. Nutr Rev 2013;71(12):773-89.

³ Goehring KC, et al. J Nutr. 2016;146(12):2559-2566.

⁴ Agence canadienne d'inspection des aliments. Allégations santé – allégations nutritionnelles fonctionnelles. Dernière modification : 2019-10-31. [Consultation en ligne : 2023-11-14.

⁵ Zimmer JP, et al. Clin Ophthalmol. 2007;1:25-35.

⁶ Krinsky NI, et al. Annu Rev Nutr. 2003;23:171-201.

⁷ Vishwanathan R, et al. JPGN. 2014;59(5):659-65.



Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le www.abbottnutrition.ca

Similac Pro-Advance® Étape 1 prêt à servir

Préparation enrichie de 2'-FL (un oligosaccharide), d'ADH et d'ARA

⁸ Johnson EJ. *Nutr Rev.* 2014;72(9):605-12.
⁹ Kuchan MJ, et al. *Curr Dev Nutr.* 2018;2:nzy055
¹⁰ Kuchan MJ, et al. *Br J Nutr.* 2016;116(1):126-31.

Ingrédients

Liquide Non Aromatisé:

Eau, Lactose, Lait Écrémé en Poudre ou Évaporé, Huile de Carthame à Teneur Élevée en Acide Oléique, Huile de Soya, Huile de Copra, Concentré de Protéines de Lactosérum, Fructooligosaccharides, Huile de M. Alpina (une Source d'ARA), Huile de Schizochytrium sp. (Une Source d'ADH), Monoglycérides, Lécithine de Soya, 2'-fucosyllactose (2'-FL), Carraghénine, Taurine, M-Inositol, Cytidine-5'-Monophosphate, L-Tryptophane, Guanosine-5'-Monophosphate Disodique, Uridine-5'-Monophosphate Disodique, Adénosine-5'-Monophosphate, L-Carnitine, Lutéine, MINÉRAUX (Citrate de Potassium, Carbonate de Calcium, Citrate de Sodium, Chlorure de Potassium, Chlorure de Sodium, Phosphate Dipotassique, Chlorure de Magnésium, Sulfate Ferreux, Hydroxyde de Potassium, Sulfate de Zinc, Sulfate de Magnésium, Sulfate de Cuivre, Sulfate de Manganèse, Iodure de Potassium), VITAMINES (Acide Ascorbique, Bitartrate de Choline, Chlorure de Choline, Acétate de D-Alpha Tocophéryle, Nicotinamide, D-Pantothénate de Calcium, Palmitate de Vitamine A, Chlorhydrate de Chlorure de Thiamine, Riboflavine, Chlorhydrate de Pyridoxine, Acide Folique, Phylloquinone, Bêta-Carotène, D-Biotine, Vitamine D3, et Cyanocobalamine).

Allergens: Contient : Lait, Soya.

Présentation

Numéro De Référence	Item
6726713	Similac Pro-Advance® Étape 1, prêt à servir; bouteilles de plastique de 235 mL; 16/caisse
6818413	Similac Pro-Advance® Étape 1, prêt à servir; bouteilles de plastique de 59 mL; 24/caisse

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le www.abbottnutrition.ca

Similac Pro-Advance® Étape 1 prêt à servir

Préparation enrichie de 2'-FL (un oligosaccharide), d'ADH et d'ARA

Information Nutritionnelle - Liquide Non Aromatisé

	100 mL	100 Cal
	Valeur	Valeur
Énergie, Cal (kJ)	68 (280)	100 (419)
Protéines, g	1,4	2,07
Taurine, mg	4,1	6,07
Carnitine, mg	0,82	1,2
Tryptophane, mg	22	33,1
Lipides, g	3,7	5,49
Acide linoléique, g	0,65	0,966
Acide linoléique, g	0,063	0,093
Acide arachidonique (ARA), g	0,017	0,025
Acide docosahexaénoïque (ADH), g	0,011	0,016
Glucides, g	7,3	10,8
Fibres, g	0,18	0,27
2'-fucosyllactose (2'-FL), mg	20	30
Inositol, mg	3,8	5,6
Lutéine, mg	0,0053	0,0078
Nucléotides, mg	7,2	10,7
Vitamine A, UI	203	300
Vitamine D, UI	35	51,8
Vitamine E, UI	2,5	3,7
Vitamine K, mg	0,0083	0,0123
Vitamine C, mg	9	13,3
Thiamine, mg	0,064	0,0947
Riboflavine, mg	0,11	0,163
Niacine, mg	0,45	0,666
Vitamine B6, mg	0,054	0,0799
Acide folique, mg	0,0095	0,0141
Vitamine B12, mg	0,00023	0,00034
Acide pantothénique, mg	0,40	0,59
Biotine, mg	0,0025	0,0037
Choline, mg	9,8	14,5
Sodium, mg	18	26,6
Potassium, mg	79	117
Chlorure, mg	40	59,2
Calcium, mg	53	78,4
Phosphore, mg	26	38,5
Magnésium, mg	4,1	6,1
Fer, mg	1,1	1,63
Zinc, mg	0,45	0,67
Iode, mg	0,0085	0,0126

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le www.abbottnutrition.ca

Similac Pro-Advance® Étape 1 prêt à servir

Préparation enrichie de 2'-FL (un oligosaccharide), d'ADH et d'ARA

Information Nutritionnelle - Liquide Non Aromatisé

	100 mL	100 Cal
	Valeur	Valeur
Cuivre, mg	0,047	0,0695
Manganèse, mg	0,004	0,0059
Sélénium, mg	0,0008	0,00118

Caractéristiques Du Produit

	Valeur
Densité calorique (Cal/mL)	0,68
Protéines (% de l'énergie totale)	8,3
Source de protéines	Lait écrémé en poudre ou évaporé, concentré de protéines de lactosérum
Lipides (% de l'énergie totale)	49,3
Rapport oméga-6:oméga-3	8,12:1
Huile de TCM (% des lipides totaux)	0
Source de lipides	Huile de carthame à teneur élevée en acide oléique, huile de soya, huile de copra, huile de M. alpina, huile de schizochytrium sp., monoglycérides, lécithine de soya
Glucides (% de l'énergie totale)	42,4
Source de glucides	Lactose, fructooligosaccharides, 2'-fucosyllactose
Rapport Cal totales:g d'azote	304:1
Rapport Cal non protéiques:g d'azote	277:1
Eau (g/L)	904
Osmolalité (mOsm/kg d'eau)	306
Charge osmotique rénale (mOsm/L)	127
Diamètre minimal de la sonde pour l'alimentation par gravité/ pompe (Fr)	S.O.

Preparation

Mode d'emploi:

Vous devez suivre les directives suivantes pour assurer la bonne santé de votre bébé. Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon. Une hygiène, une préparation, une reconstitution et un entreposage adéquats sont importants lors de l'utilisation d'une préparation pour nourrissons. Utilisez selon les directives de votre professionnel de la santé.

Ne pas ajouter d'eau. Ne pas utiliser si la bague d'inviolabilité est manquante ou brisée.

- 1 Se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon.
- 1 Laver les gobelets ou les biberons (si nécessaire), les tétines, les bagues, les bouchons et le reste du matériel, puis les mettre dans l'eau bouillante et laisser bouillir pendant 2 minutes.
- 1 Bien agiter la bouteille et dévisser le bouchon.
- 1 Si la bouteille Similac® est utilisée : visser la tétine stérilisée. Si un autre contenant est utilisé pour donner la préparation au bébé : Verser la préparation dans les gobelets ou les biberons. Si la bouteille Similac® contient encore de la préparation, la refermer, la mettre au réfrigérateur et en utiliser le contenu dans les 48 heures.

Jeter toute quantité de préparation laissée dans le biberon plus d'une heure après le début de la tétée.

MISE EN GARDE: Ne jamais chauffer la préparation dans un four à micro-ondes, car il y a risque de brûlures graves.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le www.abbottnutrition.ca

Similac Pro-Advance® Étape 1 prêt à servir

Préparation enrichie de 2'-FL (un oligosaccharide), d'ADH et d'ARA

Storage & Handling

Réfrigérer les biberons de préparation reconstituée immédiatement; utiliser dans les 24 heures. Jeter toute quantité de préparation laissée dans le biberon plus d'une heure après le début de la tétée.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant d'Abbott Nutrition ou visiter le
www.abbottnutrition.ca